

## 【妊娠疾病】

### 1、侵蚀性葡萄胎（或者称恶性葡萄胎）

指异常增生的绒毛组织浸润性生长侵入子宫肌层或者转移至其他器官或者组织的葡萄胎，并已经进行化疗或者手术治疗的。

### 2、重度子痫：

子痫前期患者出现下述任一不良情况可诊断为重度子痫：

- （1）血压持续升高：收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$  和（或）舒张压 $\geq 110\text{mmHg}$ ；
- （2）尿蛋白 $\geq 2.0\text{g}/24\text{h}$  或随机尿蛋白 $\geq$ （++）；
- （3）持续性头痛、视觉障碍或其他脑神经症状；
- （4）持续性上腹部疼痛等肝包膜下血肿或肝破裂症状；
- （5）肝酶异常：血丙氨酸转氨酶（ALT）或天冬氨酸转氨酶（AST）水平升高；
- （6）肾功能异常：少尿（24h 尿量 $< 400\text{ml}$  或每小时尿量 $< 17\text{ml}$ ）或血肌酐 $> 106\mu\text{mol/L}$ ；
- （7）低蛋白血症伴腹水或胸水；
- （8）血液系统异常：血小板计数呈持续性下降并低于  $100 \times 10^9 /\text{L}$ ；血管内溶血、贫血、黄疸或乳酸脱氢酶（LDH）水平升高；
- （9）心力衰竭、肺水肿；
- （10）胎儿生长受限或羊水过少；
- （11）孕 34 周前发病（II-2B）。

### 3、羊水栓塞

指因羊水进入母体循环所导致的急性呼吸窘迫或者休克。需经专科医生确诊，且必须提供有呼吸困难、凝血功能障碍、休克等相关医学证明文件，并经胸部 X 光检查或者血液沉淀试验证实。